


La pyrale du buis : 3 à 4 pics de vols à ne pas rater

Apparue en France en 2008, la pyrale du buis s'est propagée très rapidement ; plus de 90% des départements de métropole étaient touchés à fin 2015.

Les dégâts observés sur les buis sont d'autant plus importants que 3 à 4 générations de chenilles peuvent se succéder sur une saison.

Une bonne identification des vols avec un monitoring précis permet de bien positionner les traitements (pour une efficacité optimale sur les jeunes chenilles) et de limiter la pression parasitaire. Les pièges doivent donc être posés peu de temps après la reprise d'activité des chenilles (fin février/début mars) et laissés en place jusqu'au milieu de l'automne.



Source : Plante&Cité



Ginko® Buxus : phéromone longue durée, sans renouvellement

Avec Ginko® Buxus, optez pour un monitoring :

- **Moins contraignant :** plus besoin de penser au renouvellement de votre phéromone
- **Plus sûr :** moins de risque de manquer le pic de vol s'il se produit pendant **les périodes à risque :**


- Par oubli ou retard du renouvellement de la solution en place



- Pendant les 2 semaines de préconisation de renouvellement des autres solutions



Ginko® Buxus : utilisable dans tous les pièges avec la même efficacité



L'INRA (Phytoma, janvier 2015), a montré que Ginko® Buxus (alias CpeX211) est aussi efficace dans les pièges à eau (1 diffuseur/piège) que dans le piège sec BUXAtrap (2 diffuseurs/piège).

Ginko® Buxus permet donc de valoriser au mieux le piège sec Buxatrap présenté comme ne nécessitant aucune intervention sur cette même période.

Préconisation : 1 piège pour 180 m² en cas d'infestation normale, 1 piège pour 30 m² si forte infestation.



Sumi Agro France 251 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 PARIS
Tél. : 01 53 67 68 58/61 - site web : www.sumiagro.com